

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《鎮咳去痰薬》

せき、たん

第②類医薬品

# せきどめコデン錠A

非麻薬性成分配合

## せきどめコデン錠Aの特長

夜中のせきで眠れない、たんがからんでのどがおかしいなど、不快な症状が体力の回復を遅れさせます。せきどめコデン錠Aは、つらいせきやたんの効果がある小さな錠剤のせきどめ薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)

### 🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。  
(4) 高齢者。  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- ※ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果**

せき、たん

**用法・用量**

次の1回量を、1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
15 才以上	2 錠	3 回
8 才以上 15 才未満	1 錠	
8 才未満	服用しないでください	

**用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

**成分・分量**


せきどめコデン錠Aは、大人1日量6錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	6錠中	作 用
チペピジンヒベンズ酸塩	75mg	非麻薬性で、せきやたんにも効果があります。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます。

添加物として、カンゾウエキス、D-マンニトール、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863[テイカ製薬(株)]  
 受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)  
 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

**テイカ製薬株式会社**

富山市荒川一丁目3番27号