

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎又は  
副鼻腔炎による諸症状の緩和

第2類医薬品

# ローリン鼻炎錠

## 特徴

- 花粉やハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎、急性鼻炎や副鼻腔炎によるくしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目などのつらい症状を緩和します。
- どこでも水なしで飲め、口の中でふわっと溶けるチュアブル錠です。
- 7歳以上のお子様から服用できます。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます)

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

#### 4. 長期連用しないでください

### 🗨 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

#### (4) 次の診断を受けた人。

緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

裏面もよくご覧ください。

4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

#### 用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回を限度とし、かむか、口中で溶かして服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください。	

#### （用法・用量に関する注意）

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながります。）



#### 成分・分量 成人1日量の6錠（1320mg）中

成分	分量	はたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目などのアレルギー症状をしずめます。
フェニレフリン塩酸塩	30mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、鼻づまりを改善します。
ベラドリン20 (ベラドンナ総アルカロイド)	3mg 0.6mg)	鼻汁と涙液の分泌を抑制して、鼻水をおさえ、なみだ目を改善します。

添加物として、バレイショデンプン、D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、タンニン酸、クロスポビドン、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸水和物、L-メントール、香料、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

#### 保管および取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。

#### 問い合わせ先（お客様相談係）

電話番号：076-431-8863[テイカ製薬(株)]  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**  
富山市荒川一丁目3番27号

A NP\*\*\*\*