

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

目の疲れ・充血・かゆみに

新テイカ目薬ゴールド

新テイカ目薬ゴールドは

目の疲れを和らげるL-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム、目の充血を取り除くナファゾリン塩酸塩、目のかゆみを抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩などを配合した清涼感のある目薬です。

長時間のテレビ、読書、車の運転や細かい作業など目の酷使による目の疲れ・充血、またアレルギーによる目のかゆみの不快な症状などを緩和します。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (4) 次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。



容器の先をまぶた、まつ毛に
触れないようにしましょう

（裏面につづきます）

- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。
- (6) 用法・用量を厳守してください。

成分とはたらき

無色澄明な点眼液で次の成分を含んでいます。

| 成分 | 含量(100mL中) | はたらき |
|------------------------------|------------|-------------------------------|
| L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム (等量混合物) | 2000mg | 目の細胞にMg、Kを補給し活力を与え、目の疲れを和らげます |
| ナファズリン塩酸塩 | 3 mg | 目の充血を取り除きます |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 10mg | 目の炎症やかゆみを抑えます |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 100mg | 目の角膜の乾燥を防ぎ、潤いを与えます |

添加物として、ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、*l*-メントール、ハッカ油、*d*-ボルネオール、ウイキョウ油を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



お客様相談係

電話番号：076 (431) 8863 [テイカ製薬(株)]
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

包装 15mL

おねがい

品質を保持するため高温下となる所に置かないでください。
自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。



製造販売元
テイカ製薬株式会社
〒930-0982 富山市荒川一丁目3番27号