

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アレルギー専用点眼薬

第2類医薬品

花粉・ハウスダストなどによる 目のかゆみ・充血に

アイカフーンAGプラス

◆アイカフーンAGプラスは、〈抗アレルギー成分〉クロモグリク酸ナトリウム、〈抗ヒスタミン成分〉クロルフェニラミンマレイン酸塩、〈抗炎症成分〉グリチルリチン酸二カリウムに加え、〈角膜保護成分〉〈疲労回復成分〉の6つの有効成分を配合した、花粉・ハウスダストなどによる目のアレルギー症状によく効く眼科用薬です。

◆さわやかなさし心地のクールタイプです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
- (6) 次の診断を受けた人。 緑内障
- (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。

- 片方の目だけに症状がある場合。
- 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合。
- 視力にも影響がある場合。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2日間位使用しても症状がよくなる場合。

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面につづきます)

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

【用法・用量】

1回1～2滴、1日4～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用에만使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】(100mL中)

成分	分量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1000mg	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。
グリチルリチン酸二カリウム	125mg	アレルギーにより発症した炎症を鎮めます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	200mg	目の角膜の乾燥を防ぎ、潤いを与えます。
ピリドキシン塩酸塩	100mg	目の新陳代謝を活発にし、目の疲れを和らげます。
タウリン	1000mg	

添加物としてホウ酸、ホウ砂、エドト酸ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、エタノール、d α -カンフル、d-ボルネオール、 ℓ -メントールを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車の中や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってから使用してください。


お客様相談係

電話番号：076(431)8863〔テイカ製薬株〕
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**
富山市荒川一丁目3番27号