

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《胃腸鎮痛鎮痙薬》 **新びたり丸** 第②類医薬品

**特 徴**

新びたり丸は、鎮痛作用のあるアミノ安息香酸エチル、鎮痛鎮痙作用のあるロートエキス3倍散に、4種類の健胃生薬と利胆剤を配合し、胃痛、腹痛、さしこみなどに効果があります。

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が  
起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
6才未満の乳幼児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。)



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**その他の注意**

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ（<sup>せんつう</sup>疝痛、<sup>しゃく</sup>癩）、胃酸過多、胸やけ

## 用法・用量

次の1回量を、1日2回を限度として服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

15才以上……………1回 25粒（1包）

11才以上15才未満……………1回 17粒

8才以上11才未満……………1回 13粒

6才以上8才未満……………1回 9粒

6才未満……………服用しないでください

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

1日量50粒中に次の成分を含んでいます。

オウバク末……………475mg

オウレン末……………240mg

ゲンチアナ末……………200mg

センブリ末……………32mg

ロートエキス3倍散……………90mg

（ロートエキス……………30mg）

アミノ安息香酸エチル……………300mg

ウルソデオキシコール酸……………12mg

添加物として、バレイシヨデンブン、カルメロースCa、ハチミツ、デヒドロ酢酸Na、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、寒梅粉、アラビアゴム、ゼラチン、薬用炭、赤色102号、青色2号及び黄色5号を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限（外袋に記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。


問い合わせ先（お客様相談係）

電話番号：076(431)8863[テイカ製薬㈱]

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**

富山市荒川一丁目3番27号