

腰痛

冷感・微香性

消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品

スキピタ<sup>®</sup>パップ

貼っても臭いが気にならない!  
関節にも貼り良い 伸縮性!  
高い冷却効果!

肩こり

筋肉痛

ビタミンE 配合

6枚入

チャック

開封後はチャックをきちんとして保管してください。



ここからハサミでお切りください。

チャック

ここからハサミでお切りください。



開封後はチャックをきちんとして保管してください。

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。

腰痛、肩こり、筋肉痛に

# スキピタ<sup>®</sup>パップ 6枚入

ビタミンE配合の鎮痛・消炎パップ剤 **第3類医薬品**

## スキピタパップの特長

1. 貼っても臭いが気にならない微香性です。
2. のびのびタイプで、肌にぴったりフィットします。
3. 含水性にすぐれ、高い冷却効果を発揮します。

## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
2. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書(アルミ袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■ 効能・効果

腰痛、肩こり、筋肉痛、打撲、捻挫、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛



肩こり  
腰痛



打撲  
ねんざ



筋肉痛  
関節痛

## ■ 使用法

1日1～2回、表面のプラスチックフィルムをはがして、患部に貼付してください。

《使用法に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部が汗等でぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (3) 使用法を厳守してください。

## ■ 成分・分量 (100g(1,000cm<sup>2</sup>)中)

サリチル酸グリコール 1.0g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.3g、グリチルリチン酸 0.02g、 $\beta$ -メントール 0.2g(添加物として、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒマシ油、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、カルメロースNa、無水ケイ酸、プロピレングリコール、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、酒石酸、エデト酸Naを含有します。)

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

お客様相談係

お問い合わせ先 テイカ製薬株式会社

電話 076-431-8863

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

包装 6枚入 [7.5cm×14.0cm]

使用期限  
(西暦年月)

¥700+税



製造販売元

**テイカ製薬株式会社**

〒930-0982 富山市荒川一丁目3番27号 D

副作用被害救済制度

☎0120-149-931